

Aminoácidos de síntesis

SD Root

ABONO C.E.

Fertilizante con aminoácidos de síntesis y NP.

Bioactivador del enraizado

3-8-0

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aplicación y dosis

Foliar: 2,5 – 3 litros /hectárea

Aminoácidos libres, de síntesis	2,0 % m/m
Nitrógeno total (N) en forma amoniacal	3,0 % m/m
Pentóxido de Fósforo (P_2O_5) soluble en agua	8,0 % m/m
Péptidos de bajo peso molecular	2,0 % m/m
Ácidos policarboxílicos	16,0 % m/m

Características

SD Root, tiene entre los aminoácidos más representativos a aquellos que son precursores de las poliaminas, del óxido nítrico tales como la arginina, lisina y metionina, necesario para el desarrollo radicular. El aminoácido precursor de las auxinas, es el triptófano, que favorece el desarrollo meristemático, y crecimiento inicial de frutos. Los ácidos policarboxílicos de **SD Root**, mejoran la dinámica de absorción y translocación de los nutrientes esenciales y actúan de transportadores de hormonas y enzimas, siendo un poderoso y rápido biorregulador de la dinámica floral y del crecimiento de las raíces.

La incorporación de fósforo en forma muy asimilable a **SD Root**, activa la división celular, contribuyendo al desarrollo radicular.

SD Root, utiliza una molécula de bajo peso molecular, que favorece el enraizado en sinergia con el resto de componentes. La aplicación de **SD Root**, esta recomendada en las primeras fases de desarrollo del cultivo, así como varios días después del transplante, si se quiere estimular el enraizado.

Aminoácidos de síntesis

SD Root

ABONO C.E.


Fertilizante con aminoácidos de síntesis y NP.

Bioactivador del enraizado

3-8-0

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aminograma



GLUTAMICO	11,66%	ACIDO ASPARTICO	13,19%
FENILALANINA	1,40%	LEUCINA	1,47%
TIROSINA	0,47%	VALINA	1,23%
LISINA	11,66%	TREONINA	0,98%
METIONINA	9,33%	ISOLEUCINA	0,49%
GLICINA	11,19%	HISTIDINA	0,49%
PROLINA	7,46%	SERINA	0,25%
HIDROXIPROLINA	5,60%	TRIPTOFANO	9,33%
ALANINA	4,17%	CISTEINA	0,05%
ARGININA	19,59%		