

Micronutrientes

SD Boron Up

ABONO C.E.

Abono líquido de Boro al 2,5 %
y quelato de Magnesio al 5 %

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aplicación y dosis

Foliar: 6 - 6,5 litros / hectárea

Agentes quelatantes y acomplejantes:

Ácidos policarboxílicos

$C_{10}H_{10}O_8$

Trietanol- amina

Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua

5,0 % (m/m)

Boro (B) soluble en agua

2,5 % (m/m)

Características

SD Boron Up es un abono líquido con un 2,5% de Boro acomplejado con la trietanol-amina, además de un 5% de Magnesio quelado con el ácido hexahidroxí cáprico.

El Magnesio confiere resistencia a la planta contra las bajas temperaturas. Favorece la síntesis proteica y por consiguiente el desarrollo de la planta y de los frutos. Igualmente, el Magnesio forma parte del núcleo de la molécula de clorofila, aumentando la fotosíntesis.

La síntesis del acetilcoenzima A, precursor de los ácidos grasos, se ve influida por la activación de diversos enzimas dependientes del Mg.

El Boro mejora la estructura de las paredes celulares siendo un componente de la membrana.

SD Boron Up es compatible con la mayoría de fitosanitarios del mercado.